AVERTISSEMENTS AGRICOLES

R

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE

ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Ancienne Conserverie de CASAMOZZA

I.UCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique No 157 28 Septembre 1989

SALADES : Protégez les plantations

PROCESSIONNAIRES DU PIN : Prévoyez votre traitement

AGRUMES : Les cératites sont nombreuses

SALADES

Les traitements contre les noctuelles et les limaces sont à effectuer avant la mise en place de la culture ou juste aprés.

Matière Active	. Spécialité	Efficacité :	contre
	commerciale	noctuelles	limaces
Acephate .	ORTHENE 50 pulvérisation	+++	
Carbaryl	: SEVIN : appat ou pulvérisation	++	
Chlorpyriphos ethyl	: DURSBAN 5 G : et appat	: ++	
Phoxime	: VOLATON 5 : granulés	: : +++ :	
Cypermethrine	: NS : pulvérisation	: :	
Deltamethrine	: DECIS : pulvérisation	: : +++ :	
		:	• • •

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA Directeur - Gérant : J.C. COQUET

> Abonnement Annuel : Régisseur de Recettes

'n

Publication Périodique CPPAP N° 1769 - AD

I S S N C7 39 - 9633

	:			
Permethrine	: AMBUSH	: +++		
	: GRANADOR	:		
	: PERTHRINE	:	:	
	: Pulvérisation	:	:	
	.:			
Mercaptodimethur	: MESUROL	:	: ++	
	: Appa t, et granulés	:	:	
	4 : HI EL H E E E E E E E E E	:	:	
Metaldehyde	: NS appats	:	: ++	
	: et granulés	:	: 11	

++ Efficacité moyenne

+++ Efficacité bonne

- * Interdit en SUISSE (sur toutes cultures)
- --> Epandre les granulés sur le sol sans atteindre.le feuillage
- --> Les formulations à base de lindane sont déconseilées en cultures maraîchéres.

PINS

** Processionnaires du pin

En basse altitude les éclosions de jeunes chenilles devraient avoir lieu dans une dizaine de jour. Un premier traitement devra avoir lieu le 15 <u>octobre</u>. Vous pouvez utiliser :

- bacillus thuringensis	BACTOSPEINE PM 16000 S	0,6 kg/ha
	DIPEL P M THURICIDE	0,6 Kg/ha 0,5 Kg/ha
- di flubenzuron	DIMILIN	170 ml

La Fédération des Groupements de Défense de Haute Corse (Monsieur FILIPPI Ruche Foncière - 20215 ARENA VESCOVATO) peut mettre à la disposition des particuliers un appareil de traitement.

AGRUMES

Le niveau de population de ceratite augmente dans les piégeages.

On denombre ces insectes dans les parcelles de kaki à SAN GIULIANO et à

VENZOLASCA.

En agrumes, elles ont été observées à la fois en gobe mouches, et en piège diffusion dans tous les postes de MARANA, DE CASINCA, à SAINTE LUCIE DE MORIANI, à LINGUIZZETTA à BRAVONE. D'autres observations font état de leur présence sur SAN GIULIANO, ALERIA, ANTISANTI. Par contre, elles ne sont pas encore présentes sur MIGLIACCIARO ni sur ABBAZIA. On dénombre également des cicadelles vertes.

Il est donc préférable de traiter dés réception du bulletin.

--> Limitez pour l'instant vos traitements aux arbres de bordures des parcelles.

--> **Préferez un mélange** d'attractif BUMINAL et d'un insecticide (ROGOR, LEBAYCID ou ANIHIOFORI).